

گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰

برگه شماره ۶۴۵۶ - اردستان

جغرافیا و ریخت شناسی

ورقه یکصد هزارم اردستان در بخش جنوب خاوری چهارگوش یک دویست و پنجاه هزارم کاشان (م. زاهدی - س. م. عمیدی) قرار دارد. این ورقه مختصات جغرافیایی $30^{\circ} 52' 00''$ طول خاوری و $33^{\circ} 30' 00''$ عرض شمالی در شمال خاوری استان اصفهان واقع شده است.

آب و هوای منطقه بدلیل نزدیکی و مجاورت با کویر، معمولاً در تابستانها گرم و خشک و در زمستانها سرد است، در حالیکه نواحی کوهستانی منطقه در تابستانها آب و هوای نسبتاً معتدلی دارد.

دمای هوا در گرمهترین روز سال گاه به حدود 48° درجه سانتی گراد و در سردترین روز به حدود 5° تا 10° درجه سانتی گراد زیر صفر می‌رسد. قنوات و چشمه‌ها مهمترین منابع تامین کننده آب کشاورزی و آشامیدنی محدوده مورد مطالعه به شمار می‌روند. متاسفانه با خشک شدن بیشتر چشمه‌ها در فصول گرم منطقه با مشکل کم آبی مواجه است. در محدوده مورد نظر رودخانه دائم و پراپ وجود ندارد. رودهای زفرقند و عباس آباد مهمترین رودهای فصلی و کم آب منطقه هستند.

گندم، جو، گردو، توت و انار از مهمترین محصولات کشاورزی منطقه‌اند. صنعت قالی بافی در این نواحی از اهمیت خاصی برخوردار است.

راه اصلی تهران - بندرعباس مهمترین راه ارتباطی این ناحیه با سایر نقاط ایران است. به منظور دستیابی به بروونزدهای زمین شناسی منطقه می‌توان از راههای آسفالت اردستان - نائین در خاور منطقه، اردستان - اصفهان در بخش میانی، ظفرقند - زفره در بخش جنوبی و اردستان - نطنز در بخش شمالی منطقه استفاده نمود. از این راهها، تعداد زیادی جاده‌های خاکی منشعب می‌گردد که دسترسی به تمامی منطقه را امکان پذیر می‌سازد.

در بخش میانی این ورقه رشته ارتفاعاتی با روند شمال باختری - جنوب خاوری و در امتداد رشته کوههای کرکس در نواحی نطنز گسترش دارد. بلندترین نقطه ارتفاعی در کوه دورجین با ارتفاع 2947 متر و پست ترین نقطه در دشت شمال اردستان با ارتفاع 978 متر می‌باشد. تنوع سنگ شناسی و رسوبات، عوامل زمین ساختی و گسل خوردگی‌های فراوان و همچنین فرسایش از عوامل موثر در ایجاد اختلاف ارتفاع و شکل گیری زمین ریخت منطقه می‌باشند. سنگهای آنشفسانی و آذرآواری و سنگهای نفوذی ارتفاعات عمده‌ای را در بخش میانی و قسمتی از باختری منطقه تشکیل داده‌اند، بطوريکه دره‌های پدیدار در این نواحی معمولاً تنگ و ژرف هستند و شب تپوگرافی نسبتاً زیادی دارند. کوههای نواحی باختری منطقه پراکنده و کم ارتفاع می‌باشند. دشت عباس آباد در خاور این کوهها گستردگ است که در خاور توسط گسل از رشته کوههای با روند شمال باختری - جنوب خاوری جدا می‌گردد.

چینه شناسی

پالئوزوئیک

کهن ترین بیرونزدگی از سنگهای پالئوزوئیک، در ناحیه مورد بررسی، مربوط می‌شود به سنگهای آهکی و آهکی - دولومیتی با سن دونین، که بر روی آنها به صورت‌های گسله و دگرشیب نهشته‌های ماسه سنگی و آهکی فوزولین دار پرمین قرار می‌گیرد.

D^I_b

این واحد از سنگ آهکهای تیره رنگ حاوی براکیوپود و کرینوئید به ضخامت ۵۰ الی ۷۰ متر تشکیل می‌گردد که بطور گسله در بخش جنوبی منطقه، در شمال گسله معکوس کله سیاه، بروند دارد. برای این واحد، با توجه به فسیل Cryptophylus sp. سن دونین بالایی در نظر گرفته می‌شود (گلشنی - عسگری).

P^I

این واحد بطور عمده در جنوب باختری ورقه بروند دارد و از یک توالی سنگهای آهکی تیره رنگ، سنگ آهک دولومیتی، دولومیت و ماسه سنگ، در شمال کوه لامار و شمال و جنوب روستای خاصه تراش، تشکیل شده است. وجود فسیل‌های Gymnocodium sp. , Vermiporella sp. (ق. عسگری) سن مرغابین را برای این واحد مشخص می‌نماید. ستبرای این واحد در جاهای مختلف از ۲۰ تا ۵۰۰ متر متغیر است. این واحد در جنوب باختری ورقه در جنوب روستای خاصه تراش به ترتیب از پائین به بالا از کوارتزیت و ماسه سنگ در قاعده (P^{s1}), سنگ آهک فسیل دار تیره رنگ و آهک دولومیتی (P^{ls2}) و در بالاترین بخش از دولومیتهای خاکستری تیره رنگ (P^{d3}) تشکیل شده است. ارتباط این واحد با سازند شتری، در شمال روستای خاصه تراش، بصورت راندگی است ولی در جنوب این روستا، سنگهای آهکی کرتاسه پائین با مرز گسلی در روی این واحد قرار می‌گیرد.

مزوزوئیک**TR1**

این واحد از حدود ۵ متر کوارتزیت آهن دار تیره رنگ به همراه چند متر شیل قرمز رنگ در شمال خاوری کوه کله سیاه، تشکیل شده است. ارتباط این واحد با واحد زیرین آن گسله است، بطور هم شبیه پیوسته توسط دولومیتهای سازند شتری پوشیده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان این واحد را با سرخ شیل معادل دانست.

TR_{sh}

این واحد شامل دولومیتهای ضخیم لایه تا تودهای به رنگ آجری تا زرد و گاهی قرمز تا خاکستری روشن، است که بخشهایی از آن سیلیسی و چرت دار می‌باشد. ستبرای این واحد حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر برآورد می‌گردد و گستره ترین بروند آن در جنوب باختری ورقه، در کوه لامار، قابل رویت است. این واحد میتواند با سازند شتری قابل مقایسه باشد.

TRn1^c

این واحد از گنگلومرای خاکستری رنگ، همراه با ماسه سنگهای قرمز رنگ تشکیل شده است. عناصر سازنده گنگلومرا با ابعاد یک تا ده سانتیمتر، جور شدگی نسبتاً ضعیف و گردشگی متوسط، مشخص می‌شوند. در حالیکه ماسه سنگها با لایه بندی متوسط بافت دانه ریز تا متوسط دارند. ستبرای واحد مزبور، که در جنوب باختری روستای عباس آباد بروند یافته، به ۱۰ الی ۱۵ متر می‌رسد.

TRn1

این واحد در نواحی باختر عباس آباد، شمال روستای فسخود و جنوب کمشچه گسترش دارد و شامل شیلهای تیره تا سیاهرنگ همراه با ماسه سنگهای کوارتزی و سنگ آهکهای دولومیتی زرد تا خاکستری رنگ است. ستبرای این واحد در نواحی مختلف متفاوت است و از ۱۷۰ الی ۲۵۰ متر نوسان دارد. وجود فسیل‌های Involutina sp. و Involutina ct. gaschel sp. سن تریاس پسین را برای این واحد مشخص می‌سازند. در بالاترین بخش این واحد، در شمال کوه لامار، ضخامتی حدود ۳۰ متر از سنگ آهکهای هتراستریدیوم دار دیده می‌شود. (TRn2^c معادل با سازند نای بند). گذر بین تریاس و لیاس تدریجی است.

ژوراسیک**J^{ssh}_s**

این واحد مجموعه متناوبی است از شیلهای خاکستری تا تیره رنگ، ماسه سنگ دانه ریز تا دانه متوسط به رنگ سبز زیتونی تا خاکستری و سیلنسنستون همراه با میان لایه‌های آهکی - شیلی، با ضخامت حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر که در

جنوب کوه پازنو و شمال کوه لامار. در بخش حاشیه جنوب خاوری ورقه بروند دارد. بخشهایی از این واحد کاملاً از شیل‌های تیره تا سیاهرنگ (J_s^{sh}) تشکیل شده است.

کرتاسه تحتانی K_1^c

این واحد از ۳۰ تا ۶۰ متر ماسه سنگ و کنگلومرای قرمز رنگ همراه با سنگ آهک ماسه‌ای تشکیل شده است. که معمولاً با دگرشیبی بر روی واحدهای قدیمی تر (بیشتر لیاس و تریاس) قرار می‌گیرد. این کنگلومرا بیشتر از قلوه‌های گرد شده کوارتزیتی و سیلیسی ترکیب یافته که با سیمان قرمز رنگ رسی - ماسه‌ای به یکدیگر پیوند خورده‌اند. کنگلومرای قاعده کرتاسه در بیشتر برونددها و بعلت حرکت واریزه‌های لایه‌های کرتاسه، بر روی شمشک دیده نمی‌شود.

K_1^l

این واحد شامل یک توالی از سنگ آهکهای اوربیتولین دار متوسط تا ستبر لایه و آهکهای ماسه‌ای دولومیتی همراه با لایه‌های از شیل و مارن می‌باشد. که معمولاً با یک ناپیوستگی زاویه دار و پیشرونده با واسطه کنگلومرای K^c بر روی سازند شمشک و یا واحدهای قدیمتر جای می‌گیرد. ضخامت این واحد نسبتاً زیاد است و به حدود ۵۰۰ الی ۷۰۰ متر می‌رسد. این واحد بیشتر در باخته و جنوب باخته منطقه گسترش دارد.

K_1^{sh}

این واحد با گسترش در جنوب باخته روستای کمشچه از شیلهای آهکی کاملاً تیره تا سیاهرنگ آمونیت دار، شیل‌های تیره و آهک مایه‌ای تشکیل شده است. ضخامت این واحد به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر می‌رسد.

K_1^{ls}

این واحد از سنگ‌های آهکی دانه درشت، آهک ماسه‌ای و دولومیتی آجری رنگ تشکیل شده است. حضور فسیلهای سن آپسین - آلبین را به این واحد می‌دهد.

K_1^{lm}

این واحد تنابی از سنگ‌های آهکی اوربیتولین دار نازک تا متوسط لایه. به رنگ خاکستری تا خاکستری تیره و مارن‌های خاکستری تا زرد است که در جنوب روستای فسخود بروند دارد ستبرای این واحد حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر می‌باشد. بررسی فسیلهای Concava Orbitolina aff discoidea سن آپسین - آلبین را برای این واحد مشخص می‌سازد.

کرتاسه فوقانی

K_2^{sh}

این واحد از سنگ‌های آهکی اینوسراموس دار خاکستری تا زرد متمایل به کرم همراه با مارن‌های سیلتی و آهک ماسه‌ای ترکیب یافته است. آهکها لایه بندی دارند. و گاه متورق نیز می‌باشند. فسیلهای زیر سن سنومانین - کنیاسین را برای این واحد مشخص می‌کنند (ق. عسگری).

Hedbergella sp. Calcisphaarula innominata lata

این سنگها در باخته گسل میلاجرد - زفره (ادامه گسل قم - زفره) و جنوب منطقه رخنمون یافته‌اند، ستبرای این واحد از ۱۰۰ تا ۶۰۰ متر متغیر است.

واحد مذکور بطور ناپیوسته و هم شیب و گاه گسله بر روی واحدهای کرتاسه زیرین و یا قدیمتر قرار می‌گیرد.

K_2^l

این واحد از سنگ‌های آهکی بلورین کاملاً سفید تا سفید متمایل به خاکستری تشکیل شده است. لایه بندی در آنها نازک تا متوسط است و ستبرای آن به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر می‌رسد. همبری این واحد با واحدهای مجاور کاملاً بریده می‌باشد. علیرغم آنکه در این واحد فسیل خیلی اندک است. ولی نتایج فسیل شناسی سن کرتاسه بالا را برای این واحد مشخص می‌نماید. این واحد در خاور روستای حسن آباد و در راستای مجموعه گسل‌های مربوط به میلاجرد - زفره رخنمون دارد.

K^{sh}₂

این واحد یک توالی از مارن‌های سبز خاکستری تا زرد همراه یا بین لایه‌هایی از سنگ آهک تیغه‌ای شکل و شیل‌های آهکی خاکستری را تشکیل داده است. ستبرای این واحد حدود ۵ تا ۲۰ متر است. بروند آن در گوشه جنوب باختری ورقه، در اطراف روستای خاصه تراش، قابل دیدن است. فسیل‌های *Heterohalix* و *Calcisphaerula innominata lata* sp. سن کرتاسه پایانی را به آن نسبت می‌دهند.

پالئوژن

بر روی آهک‌های کرتاسه پائین و بالا و بسانزنهای شمشک و تریاس و سری آتشفشنای - رسوبی ائوسن بطور دگر شبیب و گاهی گسله قرار گرفته است. در بخش‌های رسوبی و آذرآواری این سری، لایه‌بندی کاملاً واضح و مشخص ولی گدازه‌ها و توفه‌ها و برشهای بیشتر توده‌ای هستند.

ائوسن**E^c₁**

شامل ستبرایی حدود ۱۵۰ تا ۱۰۰ متر کنگلومرا با جورشدگی و گردشیدگی نسبتاً خوب متشکل از قطعات آهکی کرتاسه و ژوراسیک و سیمان آهکی - رسی به رنگ قرمز، ماسه سنگ خاکستری تا قرمز رنگ دانه ریز تا دانه متوسط، سنگ آهک ماسه‌ای دولومیت دار همراه با سیلتستون که در راستای مجموعه گسل‌های میلاجرد - زفره بروند دارد. این واحد کنگلومرا ای در شمال روستای فسخود بطور همشبیب و ناپیوسته بر روی سنگ آهک‌های کرتاسه بالا و همچنین در کوه سیاه کله بر روی واحد شتری قرار می‌گیرد. بخش‌هایی از این واحد کنگلومرا ای از آهک‌های ماسه‌ای دولومیت دار (E^l₁) تشکیل یافته است که ضخامت چندانی ندارد. وجود فسیلهای *Assillina; Nummulites* sp. و Operculina sp. سن ائوسن آغازین (ثیپر زین) را به آن اختصاص می‌دهد. در باختر کوه سنگ بادامی ضخامتی از برش اندزیتی بنفسن رنگ به همراه کنگلومرا قرمز دیده می‌شود (E^{cv}₁) که می‌توان معادل با واحد E^c₁ قرار گیرد.

E^{vs}₂

این واحد شامل یک سری از سنگ‌های آذرآواری خاکستری تا خاکستری تیره همراه با گدازه‌های داسیت - اندزیتی و اندزیتی بنفسن تا سبز متمایل به تیره می‌باشد که بیشتر در باختر گسل میلاجرد - زفره. در نیمه جنوبی ورقه بروند دارد و ضخامتی حدود ۵۰ تا ۱۷۰ متر را در بر می‌گیرد. این واحد بطور گسله بر روی واحد E^c₁ جای می‌گیرد.

E^{ig}₂

این واحد با ستبرایی حدود ۴۰ تا ۵۰ متر از سنگ‌های ایگنیمیریتی تشکیل شده است. که در جنوب باختری روستای رنگان بروند دارد و بطور هم شبیب بر روی واحد کنگلومرا E^c₁ می‌نشیند.

E^s₂

این واحد در جنوب باختری روستای رنگان رخمنون یافته و از ماسه سنگ‌های تیره تا خاکستری با سیمان سست و شیل‌های ماسه‌ای خاکستری رنگ تشکیل شده است. واحد مزبور ضخامت زیادی ندارد و بطور همشبیب بر روی واحد E^{ig}₂ قرار می‌گیرد.

E^{br}₂

این واحد در جنوب باختری روستای گل آباد بروند دارد از برش‌های داسیت - اندزیتی قرمز رنگ و توفهای داسیتی تشکیل شده و از ضخامت ناچیزی برخوردار است.

E^{an}₂

این واحد از اندزیت و اندزیت - بازالت تیره تا خاکستری رنگ تشکیل شده است. واحد مذکور در جنوب باختری روستای گل آباد گسترش دارد و ضخامت آن از ۴۰ تا ۱۰۰ متر تغییر می‌کند.

E^{vt}₂

این واحد بصورت تناوبی از سنگ‌های ولکانیکی و آذرآواری در بخش جنوبی ورقه، در خاور گسل میلاجرد - زفره، مورد بررسی قرار گرفته است. سنگ‌های این واحد با ترکیب داسیت - اندزیت و به رنگ بنفسن متمایل به قرمز مشخص می‌شوند. لایه‌های شبیب نسبتاً ملایمی دارند و ضخامت مجموعه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر در نوسان است.

E^{sh}₂

بخشی از واحد E^{vc}_2 در باختر گسل میلاجرد - زفره از شیل‌های آهکی ورقه‌ای به رنگ خاکستری تا خاکستری متمايل به سفید تشکیل شده که ضخامت آن خیلی محدود است و در باختر گسل میلاجرد - زفره مشاهده می‌گردد.

E^t₃

این واحد بصورت تنابی از توف سنگهای داسیت‌اندزیتی، توف ماسه‌ای و آهک ماسه‌ای بروند یافته است. گسترش این واحد بصورت محدود، در اطراف گسل میلاجرد - زفره مشاهده می‌شود. که بصورت عادی و گاه گسله بر روی واحد ولکانیکی E^{vc}_2 قرار می‌گیرد.

E^{tr}₃

این واحد از سنگهای داسیتی برنگ سفید تا خاکستری همراه با توف برش با ترکیب داسیت - اندزیتی تشکیل شده ولی گسترش و ضخامت محدودی دارد که در شمال باختری روستای و مکان مشاهده می‌گردد.

E^{py}₄

این واحد ترادف نسبتاً ضخیمی از تناب سنگهای آذراواری را با ترکیب مختلف توف سنگی، توف ماسه‌ای، توف برش، سیلیستون و ایگنیمیریت و تنوع رنگ از خاکستری، سفید تا قرمز، تشکیل داده است. در بین این ردیف سنگی گاه افقهای روشن داسیتی بیوتیت دار دیده می‌شود. ردیف مذکور بیشتر در بخش مرکزی جنوب ورقه و مرکز نقشه گسترش دارد و دارای لایه بندی نسبتاً خوب است.

شیب لایه‌ها کم است و از ۱۰ تا ۱۵ درجه تجاوز نمی‌کند. واحد E^{tb}_5 بطور همشیب روی این واحد قرار دارد.

بخشهایی از این واحد، در شمال روستای علی آباد، از توف برش با ترکیب داسیتی تا ریوداسیتی تشکیل شده است.

E^{br}₄

همچنین گسترش خیلی محدودی از ایگنیمیریت با ترکیب داسیتی (E^{ig}_4) در خاور روستای و مکان و بروند کمی از گدازه‌های اندزیتی تا اندزیت - بازالتی تیره رنگ در خاور روستای رنگان (E^{v}_4) دیده می‌شود.

E^{lt}₄

این واحد از سنگ آهک ماسه‌ای توفی و دولومیت دار با لایه بندی نازک تا متوسط تشکیل شده. که در شمال باختری روستای رنگان بروند محدودی دارد. فسیلهای Nummulites globules و Nummulites atturicus و Rotalia sp. و اوسن میانی (لوتسین) را برای این واحد مشخص می‌سازند. این واحد هم از واحد E^{py}_4 می‌باشد.

E^{ln}₅

این واحد از سنگهای آهکی ماسه‌ای دولومیت دار تیره تا خاکستری رنگ با لایه بندی منظم و توف ماسه‌ای سبز متمایل به خاکستری تشکیل شده است. ستبرای این واحد حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر می‌باشد که بطور هم شیب و پیوسته بر روی واحد E^{lt}_4 می‌نشینند. واحد مذکور در شمال باختری روستای رنگان گسترش دارد.

بر مبنای فسیلهای

Nummulites atturicus; Nummulites aff. Fabiani
Operculina sp; Asterigerina sp.

می‌توان سن اوسن میانی - بالایی را به این واحد نسبت داد.

E^{tb}₅

این واحد شامل سنگهای آذراواری از جمله توف برش و توف ماسه‌ای به رنگ خاکستری تا سبز می‌باشد که از ضخامت چندان زیادی برخوردار نیست. گسترش این واحد در شمال و شمال باختری روستای توکان و علی آباد قابل رویت است. این واحد بصورت هم شیب و ناپیوسته بر روی واحد E^{py}_4 می‌نشینند.

E^{ab}

این واحد که بخش وسیعی از اوسن بالایی را در منطقه شامل می‌گردد. مجموعه‌ای از سنگهای اندزیتی تا اندزیت - بازالتی خاکستری تیره رنگ همراه با سنگهای آتشفسانی اسیدی (ربولیت و داسیت)، توف برش، ایگنیمیریت و سنگهای آذراواری به رنگ خاکستری با لایه بندی نامنظم می‌باشد. ستبرای این واحد نسبت به واحدهای دیگر اوسن قابل توجه بوده. برونددهای وسیعی را در بخش‌های مرکزی ورقه تشکیل می‌دهد. این واحد در شمال - شمال باختری روستای علی آباد بطور همشیب روی واحد E^{tb}_5 قرار می‌گیرد. واحد مذکور، در نقاط مختلف بصورت لیتلوزیهای

متفاوتی ظهور کرده است که از جمله می‌توان به توف برش‌های خاکستری رنگ (E^{br}_6)، اندازیت، اندازیت - بازالت تیره رنگ (E^{an}_6)، توف برش‌های خاکستری تا خاکستری روشن با لایه بنده منظم همراه با ایگنیمبریت (E^{bi}_6) و ایگنیمبریت به رنگ خاکستری مایل به قهوه‌ای همراه با اندازی توف ریولیتی (E^{ig}_6) اشاره نمود. شایان ذکر است که دایکهای فراوانی در جهات مختلف، واحدهای اثوسن را قطع کرده‌اند. این دایکهای در اکثر نقاط پراکنده‌اند. ترکیب دایکهای مذبور اکثراً با بافت پورفیری (an) است و زمینه گرانولار آنها حاوی کانیهای پلاژیوکلاز و پیروکسن می‌باشد.

 E^{py}_6

این واحد نیز بخشی از اثوسن بالا را در بر می‌گیرد که از انواع سنگهای آذرآواری از جمله توف برش و توف ماسه‌ای و بطور کلی گدازه‌های اندازیتی برنگ تیره، تشکیل شده است. این واحد در جنوب روستاهای علی آباد و قهساره مشاهده می‌گردد.

 E^{pa}_6

این واحد که بخش‌های بالای اثوسن فوقانی در منطقه می‌باشد. از سنگهای اندازیت پورفیری خاکستری متمایل به قهوه ای، با فنوکریستهای درشت و زیبایی پلاژیوکلاز، همراه با سنگهای داسیت - اندازیتی پورفیری ریز بلور تشکیل شده است. گسترش این واحد در نیمه شمالی ورقه و در اطراف روستاهای گنیان، بنارد و کچو سنگ قابل رویت است. ستبرای واحد مذبور بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ متر تغییر می‌کند.

 E^{ba}_6

در فوقانی ترین بخش از اثوسن بالا، ردیفی از سنگها دیده می‌شود که از گدازه‌های بازالتی تا اندازیت بازالتی کاملاً تیره رنگ تشکیل شده است. گسترش کمی از این واحد در کوه صفحه، در حاشیه جنوب خاوری ناحیه، مشاهده می‌گردد.

 E^{da}_6

این واحد عمده‌ای از داسیت و بطور محلی از ریوداسیت‌های خاکستری با فنوکریستهای نسبتاً درشت پلاژیوکلاز تشکیل شده است. این واحد با گسترش نسبتاً زیاد در نیمه جنوب خاوری ورقه، بصورت گنبد مانند، بیرونزدگی دارد. بخش‌هایی از این واحد بصورت ریولیت تا ریوداسیت و توف ریولیتی (E^{r6}) تفکیک می‌شود. همچنین در شمال روستای گل آباد بیرونزدگی از داسیت - ریوداسیت زرد تا خاکستری رنگ کمی دگرسان شده همراه با توف ریولیتی دیده می‌شود (E^{rd}_6)، رخمن کوچکی از سنگهای ریولیتی سفید و توف ریولیتی در شمال خاوری روستای آونج وجود دارد (E^r_6) را شامل می‌گردد.

 EO^{da}

این واحد بصورت یک گنبد ولکانیکی، با گسترش نه چندان زیاد، با ترکیب ریوداسیت و تراکی اندازیت برنگ خاکستری روشن تا تیره در خاور روستای اسفدان (واقع در باختری ورقه) قابل رویت است. بخش‌هایی از این گنبد ولکانیکی دگرسان شده است.

 O^r

محل رخمنون این واحد در جنوب خاوری زفرقند یا جنوب توکان و باختر روستای رنگان می‌باشد، که بصورت گنبد و دایک ظاهر شده ترکیب سنگ شناسی آن عبارت از ریولیت‌های سفید رنگ با بافت پورفیری است. در متن سنگ فنوکریستهایی از کوارتز شکل دار با حاشیه خورده شده آلکالی فلدسپات و پلاژیوکلاز، از نوع الیکوکلاز وجود دارد. بخش‌هایی از این واحد بصورت ریوداسیت، توف و ایگنیمبریت می‌باشد. بخش‌های ریولیتی این واحد در سنگهای اثوسن میانی و بالایی تزریق شده است.

 OM^c_q

این واحد از چند متر میکروکنکلومرا با قلوه‌های ریز ولکانیکی و سیمان سیلیسی با لایه بنده متوسط تشکیل شده است. رخمنون این واحد بصورت محدود در گوشه شمال باختری ورقه مشاهده می‌گردد. در این محدوده نیز ضخامت حدود چند متر از برش ولکانیکی با ترکیب داسیت تا داسیت اندازیت کاملاً تیره وجود دارد، که در زیر واحد OM^c قرار می‌گیرد. این واحد برشی OM^{br}_q در حقیقت با واحد OM^c هم ارز است و می‌توان این دو را بعنوان قاعده پیشرونده سنگهای آهکی سازند قم در نظر گرفت.

OM^q

این واحد ستبرایی متفاوت از حدود ۱۰ تا ۲۰۰ متر نهشته‌های دریایی را شامل می‌گردد. که معمولاً بطور دگرشیب و گاهی هم شیب بر روی سری آتشفسانی پالئوژن جای می‌گیرد. این نهشته‌ها شامل، ردیفی از سنگهای آهکی نازک تا متوسط لایه به رنگ کرم تا کرم متمایل به زرد می‌باشند. مهمترین برونزد آن در شمال روستای کچومنگ و باختر روستای سرهنگچه قابل رویت است. در این ردیف، میان لایه هایی از مارن و مارن ماسه ای، و فسیلهایی از مرجان و دوکهای دیده می‌شود. فسیلهای Miogypsinooides; Nummulites sp; Rotalia vientti میوسن زیرین (اکی تانین) را برای این واحد مشخص می‌کند.

OM^s_q

این واحد بطور عمده از ماسه سنگهای دانه ریز خاکستری رنگ، سیلتستون و کمی شیل با بین لایه هایی از سنگ آهک کرم رنگ دولومیت دار تشکیل شده است. واحد مذکور در اطراف روستای بنارد برونزد دارد. فسیلهای موجود در این سنگ الیکوسن پایانی را دیکته می‌کنند.

OM^{lv}_q

این واحد از تناب آهکهای کرم رنگ فسیل دار و نازک لایه و گدازه های اندزیتی تیره رنگ تشکیل شده است. حفرات موجود در این گدازه‌ها را که اکثراً دگرسان شده‌اند. کانی کلسیت پرکرده است. رخنمون این واحد بیشتر در اطراف روستای بندآستانه، بنارد و سرهنگچه قابل مشاهده است.

OM^v_q

این واحد شامل گدازه‌ها و توف های اندزیتی تیره رنگ حفره دار و دگرسان شده است، که حفرات آن بطور ثانویه توسط کلسیت پرشده است. لایه بندی در این واحد نسبتاً منظم است و گاه میان لایه هایی از سنگ آهک سازند قم در آن دیده می‌شود. ستبرای این واحد از چند متر تا چندین ده متر متغیر است. محل برونزد این واحد نیز در اطراف روستاهای بنارد، بندآستانه و گنبد عطا می‌باشد.

M^{c1}_p

این واحد کنگلومرایی با جورشدن ضعیف از قلوه‌های غالباً ولکانیکی اندزیتی و کمی آهک، با سیمانی از مواد ولکانیکی مشخص می‌شود. ضخامت این کنگلومرا از ۱۰ تا ۴۰ متر متغیر است. این واحد در حاشیه شمال باختری ورقه برونزدگی دارد.

M^{c2}_p

این واحد با جورشدن ضعیف از قلوه هایی با ابعاد یک تا ۷۰ سانتی متر از جنس ولکانیک و بطور محدود قطعات آهکی متعلق به سازند قم با سیمانی از مواد ولکانیکی سست تشکیل شده است. ضخامت این واحد در گوشه شمال باختری ورقه به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر می‌رسد.

PI^c

این واحد از نهشته‌های تخریبی با گسترش نه چندان زیاد در باختر اردستان برونزد دارد. در این کنگلومرا، خمیره‌ای از رس، مارن و ماسه، عناصری از آهک‌های قم و سنگهای آتشفسانی را در برگرفته است. این واحد با جورشدن گردشده‌گی ضعیف مشخص می‌شود.

Q^{tr}

نهشته‌های تراورتن در راستای گسل میلاجرد - زفره و در اطراف روستاهای میلاجرد، گل آباد، رنگان و کوه تخته سرخ دیده می‌شود. جنس و نوع این تراورتن‌ها بعلت وجود حفرات زیاد، مرغوب نیست. بخشهایی از این تراورتن‌ها، که از حفرات کمتری برخوردارند جهت مصارف ساختمانی مناسب بوده بصورت معدن درآمدند و در حال استخراج و بهره برداری می‌باشند.

Q^t₁

این واحد شامل نهشته هایی است که معمولاً در دامنه کوهها بصورت پادگانه‌های آبرفتی بلند و مخروط Q^t_1 دیده می‌شوند. این نهشته‌ها بیشتر در اطراف اردستان و باختر گسل میلاجرد - زفره گسترش دارند.

Q_2^t

این نهشته‌ها معمولاً در سطوح مختلف توبوگرافی ولی در ترازهای پست تری نسبت به واحد Q^1 آشکار می‌گردد و نهشته‌های مذکور شامل نهشته‌های مخروط افکنه‌ای Q^2 و ته نشسته‌های سخت نشده قلوه دار است. بخش گسترده‌ای از دشتهای شمال و جنوب اردستان و دشت عباس آباد را پدیدار ساخته‌اند. ستبرای این واحد متغیر است و گاه تا چند متر می‌رسد.

 Q^{al}

این نهشته‌ها بیشتر بصورت ریگ و ماسه‌های ریز دانه و عناصر درشت هستند که در اثر بارندگی‌های شدید و جریان سیلابها در بستر رودخانه‌های منطقه بر جای نهاده شده‌اند.

 Q^{e2}

این واحد شامل نهشته‌های بادرفتی است که در شمال - شمال خاوری منطقه بصورت تپه‌های ماسه‌ای سست دیده می‌شوند و از نظر شیبی هم ارز رسوبات رودخانه‌ای است.

 Q^{e3}

این واحد بصورت نهشته‌های ماسه‌ای روان در شمال و شمال خاوری ورقه قابل مشاهده است.

 Q^{es}

پهنه کوچکی از نهشته‌های سیلتی - رسی - نمکی در شمال ناحیه و اطراف روستای اسفدان دیده می‌شود که بخش هایی از آن چشممه‌های تراورتن ساز باعث پیدایش تراورتن در این ناحیه شده است.

سنگهای نفوذی

سنگهای نفوذی یا گرانیتوئیدی مشتمل بر چندین توده کوچک و بزرگ مجزا حدود ۷۰ تا ۷۵ کیلومتر مربع از پهنه ورقه اردستان را در برمی‌گیرند. روند عمومی این توده‌ها شمال باختری - جنوب خاوری بوده و کلاً از روند اصلی شکستگیهای موجود در منطقه تبعیت می‌نماید. این توده‌ها، نهشته‌های کهن تا سنگهای آتشفسانی متعلق به اوسن و الیگومن را قطع می‌نمایند. بنابراین زمان تزریق این مagmaها باستی بعد از الیگومن باشد. که با توجه به تعیین ۱۹-۱۷ میلیون سال (عمیدی ۱۹۷۵) این زمان با شواهد زمین شناسی نیز همخوانی دارد.

جز توده‌های گرانیتوئیدی مورده بحث (gd)، توده‌های باریک - متوسط گابرودیوریتی وجود دارند که سن آنها قدیمتر از گرانیتوئیدها (۲۳ میلیون سال - پورحسینی ۱۹۸۱) است. ذکر این نکته ضروری است که سنگهای نفوذی منطقه از جهت تنوع ترکیب از قطب بازیک (گابرو) تا قطب اسید (گرانیت) در نوسان هستند و تقسیم بندی آنها در محدوده نقشه ۱۱۰۰,۰۰۰ امکان پذیر نمی‌باشد. بیشترین گسترش سنگهای نفوذی منطقه مربوط به سنگهای دیوریتی تا مونزودیوریتی (di) است که قسمتی از ارتفاعات کوه جرگند در خاور روستای ماربین - سلیمان آباد و بلندیهای دور جین در جنوب و جنوب باختری روستای گنجان را در راستای گسل ماربین - رنگان تشکیل می‌دهند مساحت این توده دیوریتی - مونزودیوریتی حدود ۵۰-۵۲ کیلومتر مربع می‌باشد. بررسی میکروسکوپی نمونه‌های مختلف از این نشان دهنده این است که بافت این سنگها دانه‌ای و گاه افتیک بوده و از کانیهای کوارتز، پلازیوکلаз، فلدسپات آلکالن، پیروکسن و آمفیبول تشکیل شده است.

بخشهایی از این توده به سمت حاشیه دانه ریز و اسیدی تر شده و بصورت میکرودیوریت تا میکروکوارتزدیوریت (mdi) ظاهر پیدا می‌کنند. دایkehای پراکنده اسیدی گرانیتی - آپلیتی (g)، قسمتهای مختلف این توده را قطع می‌نمایند. همچنین در شمال روستای بیدشک و جنوب روستای آونج و بخشی از ارتفاعات کوه جوگند، توده‌های کوچک و بزرگی از سنگهای گرانیتی - گرانودیوریتی (gd) دیده می‌شود که بافت دانه‌ای تا میکرپگماتیت گرافیک دارند از کانیهای کوارتز، آکالی فلدسپات، پلازیوکلاز، بیوتیت و آمفیبول (هورنبلند) همراه با کانیهای فرعی اسفن و آپاتیت تشکیل شده است. مساحت این توده گرانیتی - گرانودیوریتی حدود ۲۰-۱۸ کیلومتر مربع می‌باشد. آنکلاوهایی در ابعاد کوچک و بزرگ از جنس کوارتز دیوریت به وفور در بخش‌های مختلف توده‌های اسید و متوسطه منطقه پراکنده هستند. در جنوب روستای حسن آباد و در روستای گسل زفره - میلاجرد رخمنون کوچکی از سنگهای نفوذی با ترکیب

متامونزوریوریت دیده می‌شود (md)، که دگرگونی خفیفی را متحمل گردیده است و جهت یافتنگی مختصراً در کانیهای آن مشاهده می‌گردد.

دگرسانی

منطقه محدودی از سنگهای اسیدی با ترکیب ریولیتی تا ریوداسیتی دگرسان شده در باختر روتستای گل آباد در حاشیه باختری ورقه مورد مطالعه مشاهده می‌شود. که پدیده رسی شدن را تحمل نموده است. این نوع دگرسانی‌ها می‌توانند در اثر پدیده هیدروترمال ناشی از فعالیت مagmaهای اسید در منطقه باشد. بررسی بیشتر در منطقه ضروری بنظر می‌رسد.

زمین شناسی ساختمانی

ورقه یکصد هزارم ارdestan در حاشیه باختری زون ایران مرکزی، در زیر زون ارومیه - دختر قرار دارد. زیر زون ارومیه - دختر عمده از سنگهای آتشفسانی و آتشفسانی - رسوبی وابسته به آن تشکیل شده است. که این سنگها عموماً به ترشیری تعلق داشته و توده‌های نفوذی متعددی با ترکیب متوسط تا باریک در داخل آنها نفوذ کرده‌اند. با توجه به نبود رسوبات مربوط به کربنیفر، احتمالاً واحدهای پرمین با ناپیوستگی در کنار ته نشستهای دونین قرار می‌گیرند. البته رخمنوهای دونین اغلب بصورت گسله کنار بقیه واحدهای قرار گرفته است. ولی به هر حال هیچ نوع نشانه‌ای از ته نشسته‌های کربنیفر در منطقه وجود ندارد و این نبود را می‌توان احتمالاً به فاز هرسی نین نسبت داد. بعد از تشکیل رسوبات مربوط به پرمین، یک فاز خشکی زایی موجب بالا آمدگی حوضه و ظهور ته نشسته‌های تخریبی و آهن دار (Ferrogenous) سرخ می‌شود.

حرکات سیمیرین پیشین در حد بین تریاس میانی و بالایی، منطقه را تحت تأثیر قرار داده و سازند نای بند متعلق به تریاس بالایی با یک کنگلومرای قاعده‌ای بصورت دگر شیب روی تریاس میانی (سازند شتری) می‌نشینند. گذر تریاس بالایی به ژوراسیک (سازند شمشک) تدریجی است.

در حد فاصل ژوراسیک با کرتاسه، حرکات تکتونیکی سیمیرین پسین موجب بالا آمدگی و چین خوردگی رسوبات ژوراسیک شده و متعاقب آن فاز فرسایشی ناشی از این حرکات زمین ساختی رسوبات سرخ و آواری قاعده کرتاسه را بصورت دگر شیب روی لایه‌های قدیمی تر (سازند شمشک) قرار می‌دهد. ته نشسته‌های مربوط به نشوکومین در منطقه شناخته نشده‌اند و شروع کرتاسه آغازین از آپسین - آلبین می‌باشد.

با توجه به اینکه رسوبات مربوط به سنوماتین تا کنیاسین در منطقه مشاهده نشده است، احتمالاً فاز اتریشین محدوده مورد مطالعه را تحت تأثیر قرار داده است.

رسوبات پالوسن در محدوده این ورقه وجود ندارد و ائوسن با یک کنگلومرای با ضخامت ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر بطور دگر شیب و گاه گسله در مجاورت واحدهای کرتاسه قرار دارد. این دگرشیبی نشانگ حرکات شدید فاز کوهزاوی لaramid می‌باشد که همزمان در بیشتر نقاط ایران مؤثر بوده است.

در تعقیب فاز فشاری لaramid، تنشهای کششی موجب تشکیل حوضه‌های فعال ائوسن گردیده است که در این حوضه‌ها ستبرای شایان توجهی از ته نشسته‌های آتشفسانی - رسوبی شامل مجموعه‌ای از گدازه‌های بازیک تا اسیدی و سنگهای آذرآواری بر جای گذاشته شده است. این حوضه‌ها پرتکاپو و فعال بوده و گاه حوضه‌های دریایی تمایل قاره‌ای پیدا نموده‌اند. در اواخر ائوسن و الیگوسن آغازی، گنبدهای ریولیتی و ریوداسیتی و داسیتی سنگهای ائوسن زیرین و میانی را قطع کرده است. جایگزینی این گنبدهای اسیدی، چین خوردگی‌های ائوسن و نفوذ توده‌های متوسط تا باریک (گرانودیوریت و دیوریت) و ارتباط با فاز کوهزاوی پیرنه می‌باشند.

فاز آپی نهایی به شکل واحدهای ولکانیکی و تخریبی تظاهر پیدا کرده و ته نشسته‌ای الیگومیوسن (سازند قم) با یک کنگلومرا و ماسه سنگ قاعده‌ای بصورت ناپیوستگی زاویه دار روی واحدهای قدیمی تر قرار گرفته و یا بطور گسله در کنار آنها دیده می‌شود.

تأثیر فاز فرعی مربوط به آلپی نهایی (فاز پاسادنین) در اواخر پلیوسن و اوایل کواترنری موجب چین خوردگی رسبات پلیوسن و دگرشیبی در قاعده کواترنری شده و منطقه شکل نهایی و امروزی خود را بدست آورده است. در ورقه اردستان، در اثر عملکرد قازهای زمین ساختی مختلف دگر شکلی هایی عمدتاً از نوع ساختمنهای شکستگی و چین خودگی های وابسته به آن بوجود آمده که بعلت تودهای و مقاوم بودن اکثر واحدهای سنگی، کمتر قابل تشخیص می باشند ولی در هر حال می توان آنها را در سازندهای نازک تا متوسط لایه ملاحظه کرد. مکانیسم چین خوردگی ها در ناحیه عمدتاً از نوع خمش لغزش (Flexural ship) و ظهور ریز چین ها (Drag tells) است. که نوع اخیر از حرکت گسلهای پنهان و با نفوذ توده های ماقمایی حاصل می گردد.

در جنوب باختری منطقه در سنگهای آهکی و شیلی کرتاسه بالا در ناودیس کوه کله سیاه، هر دو با امتداد محور حدود ۱۳° درجه و با یک زاویه حاده (حدود ۴۰ درجه) امتداد گسل اصلی میلاجرد - زفره را قطع می کنند. ناودیس کوه کله سیاه دارای پلانژی حدود ۳۰ درجه به سمت شمال باختری می باشد. در جنوب نسران دو ناودیس پلانژدار وجود دارند که توسط یک گسل از هم جدا می شوند. یکی از ناودیسها با امتداد شمال خاوری - جنوب باختری به سمت شمال خاوری پلانژ داشته و دیگری با امتداد خاوری - باختری پلانژی به سمت خاور دارد. ناودیس شمال کچو مثقال نیز با امتداد خاوری - باختری پلانژی به سمت باختر دارد. در منطقه مورد مطالعه گسترش سنگهای آتشفسانی و آتشفسانی - رسوبی توسط گسلهای اصلی کنترل شده و به نظر می رسد پراکندگی آنها تابعی از گسلها و یا خط وارهای اصلی ناحیه بوده است.

همین طور توده های نفوذی نیز در امتداد مناطق گسله جاگیر شده و محدوده گسترش آنها نیز توسط گسلها کنترل می شود. گسل میلاجرد - زفره که بخشی از گسل قم - زفره می باشد. با روند شمال باختری - جنوب خاوری احتمالاً بصورت یک گسل بی سنگی است و با توجه به شکستگی های موجود در منطقه، این گسل دارای مؤلفه امتداد لغز با روند حرکتی راست گرد می باشد. بطوری که می توان در ارتباط با آن شکستگی ها و گسل های رده دوم (Second order) را بر احتی شناسایی کرد.

این گسل، مانند بسیاری از گسلهای پی سنگی، بصورت یک زون با آرایش تقریباً طنابی (Annatomozing) دیده می شود که در طول آن شیب قطعات گسله موجود در سطح دارای تغییراتی است. شیب گسل از ۴۰ تا ۷۰ درجه به سمت شمال خاوری و گاه جنوب باختری متغیر است. از نظر زمین ساختی گسل فوق بصورت گذرگاهی باعث نفوذ و جایگزینی توده های نفوذی حاوی کانسنگ بوده به نحوی که در امتداد آن چندین آنومالی معدنی شکل گرفته است. در امتداد این گسل چشممه های متعدد تراورتن ساز وجود داشته اند که لایه های با ضخامت قابل توجهی از نهشته های تراورتن را بر جای گذاشته اند. این تراورتن ها در چند نقطه استخراج و بهره برداری می شوند. از نظر سنی، آخرین فعالی این گسل مربوط به فعالیت آتشفسانی نوار ارومیه - دختر توده که تا عهد حاضر (پلیوسن و کواترنری) فعال بوده است. ولی تا کنون در طول این گسل کانون زلزله گزارش نشده است (بربریان ۱۹۷۶). گسلهای راندگی اصلی منطقه از یک روند تقریباً خاوری - باختری پیروی می کنند. گسل معکوس کچو متقابل گنجان با شیب حدود ۷۰ تا ۷۵ درجه به سمت جنوب و گسل معکوس کوه دوشاخ با شیب حدود ۷۰ درجه به سمت شمال از گسلهای راندگی مهم منطقه می باشند.

گسل ماربین - رنگان با امتداد شمال باختری - جنوب خاوری با یک زاویه حاده گسله میلاجرد - زفره را قطع می کند و گسل احتمالی عباس آباد نیز با امتداد شمال - جنوب از گسلهای مهم منطقه به شمار می آیند.

زمین شناسی اقتصادی

معدن باریت کمشچه

در جنوب روستای کمشچه کانی سازی باریت یصورت رگه گرمایی در درون سنگهای دولومیتی قهوه ای تا زرد رنگ سازند شتری و نای بند در هسته انتی کلینیال کمشچه انجام گرفته و کانه های آن شامل گالن - کالکوپیریت، پیریت، ازوریت، مالاکیت، سروزیت و کانی های غیر فلزی باریت و فلئورین با رنگهای سفید و زرد است مقدار کانه های فلزی و

فلئورین در آن ناچیز بوده و فقط باریت به عنوان ماده اصلی توسط شرکت ایران باریت استخراج می‌گردد. علاوه بر این نشانه‌های پراکنده باریت در سایر نقاط ورقه نیز قابل رویت می‌باشد.

معدن متروکه سرب جنوب خاوری حسن آباد

کانی سازی در سنگهای آهک ماسه‌ای دانه درشت کرتاسه پائین صورت گرفته و کانی اصلی آن گالن است که همراه با آن کانه‌های فرعی اسفالریت و پیریت و کالکوپیریت دیده می‌شود. این معدن فعلًاً متروکه است و استخراجی در آن صورت نمی‌گیرد. اندیس‌هایی از سرب در دولومیت و آهک‌های سازند شتری و نای بند دیده شده است. کانی سازی در این معدن احتمالاً در ارتباط با فازهای آخر فعالیت مانگماهایی است که باعث تشکیل توده‌های نفوذی در این منطقه شده است.

معدن متروکه سرب فسخود

این معدن در ارتفاعات باختر روستای فسخود، در آهک‌های ماسه‌ای کرتاسه پائین قرار دارد. کانی سازی در این معدن بصورت گالن می‌باشد. بعلت زیرزمینی بودن این معدن اطلاعی از طول و عرض رگه و عیار و سایر مشخصات معدن در دست نیست. این معدن سالهای است که متروکه می‌باشد.

معدن منگنز شمال توکان

در شمال روستای توکان، در مسیر جاده اردستان - اصفهان، رگه‌ای با ترکیب داسیت - اندازیتی تیره رنگ به ضخامت تقریبی ۵ الی ۶ متر دیده می‌شود. این رگه با راستای N50 حدود ۱۰۰ متر گسترش دارد. که ماده معدنی منگنز در آن تجمع پیدا کرده است. ظاهراً ماده معدنی تماماً استخراج شده و معدن بصورت متروکه باقی مانده است.

آهن

در جنوب روستای حسن آباد و در شمال خاوری عباس آباد چند رگه و رکچه کوچک از مانگنتیت و والیژیست در داخل سنگهای ژوراسیک دیده می‌شود. که بنظر می‌رسد به علت کوچک و ناچیز بودن رگه‌ها از نظر اقتصادی قابل پیگیری نباشد.

مس

در مسیر جاده اردستان به ظفرقد، در غرب کوه شهریاری، اندیسی از مالاکیت و آزوریت بصورت آغشته‌گی در سنگهای ولکانیکی ائوسن بالا با ترکیب اندازیت و اندازیت - بازالت دیده می‌شود که فاقد ارزش اقتصادی است.

تراورتن

در راستای گسل میلاجرد - زفره و در اطراف روستای میلاجرد - رنگان پهنه‌هایی از سنگهای آهکی تراورتن دیده می‌شود. که دارای تخلخل زیاد بوده و از نظر کیفیت چندان مناسب نمی‌باشد. در جنوب رنگان در دو سه کارگاه استخراج از این تراورتن‌ها بهره برداری می‌نمایند.

سنگ ساختمانی

در حاشیه شمال باختری ورقه از سنگهای آهکی کرم رنگ متعلق به سازند قم و در مسیر جاده اردستان به اصفهان نرسیده به روستای بغم در مسیر جاده از سنگهای نفوذی دیوریتی و در حاشیه جنوب باختری ورقه از سنگهای آهکی کرتاسه پائین جهت مصارف ساختمانی استفاده می‌شود.